n° 16 – 25 juin 2018

Prévisions météo *(Données Météo France)*

Saint Girons

	mar 26	mer 27	jeu 28	ven 29	sam 30	dim 01	lun 02
	0 mm	0 mm	3 mm	2 mm	0 mm	2 mm	2 mm
	13°C	17°C	16°C	16°C	17°C	18°C	18°C
	31°C	29°C	28°C	28°C	32°C	31°C	29°C

Léran

	mar 26	mer 27	jeu 28	ven 29	sam 30	dim 01	lun 02
	0 mm	0 mm	1 mm	1 mm	0 mm	1 mm	1 mm
	11°C	15°C	17°C	16°C	17°C	18°C	18°C
	31°C	31°C	28°C	28°C	31°C	32°C	30°C

Cos

	mar 26	mer 27	jeu 28	ven 29	sam 30	dim 01	lun 02
	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	1 mm	2 mm
	13°C	17°C	17°C	16°C	17°C	18°C	18°C
	31°C	29°C	27°C	28°C	31°C	32°C	30°C

Montaut

	mar 26	mer 27	jeu 28	ven 29	sam 30	dim 01	lun 02
	0 mm	0 mm	1 mm	1 mm	0 mm	1 mm	1 mm
	15°C	17°C	19°C	17°C	18°C	19°C	19°C
	32°C	31°C	28°C	29°C	32°C	32°C	31°C

À retenir :

Le beau temps de la semaine dernière a permis de bien avancer dans la récolte des fourrages, que se soit en ensilage ou en sec.

Cette semaine, le beau temps semble prévu jusqu'à samedi soir, mais en fonction des météos, des orages peuvent éclater localement à partir de jeudi.

Les sommes de température ont dépassé les 1600°Cj en plaine, les fourrages récoltés à partir de maintenant seront fibreux.

En montagne, les 1100°Cj sont atteints à 900m, il est temps de faucher.

Données météo *(Données Météo France)*

24 juin 2018	Altitude (m)	Précipitations (mm) du 18-juin	au 24-juin	30 der n. J.	Somme de températures (°C-jour) 2018	2017	année moy	Fauche précoce 1100 °j	fauche tardive 1300 °j	Foin fibreux prairie tardive 1600 °j
St-Girons	414 m	1 mm		128 mm	1606	1911	1630	25-mai	6-juin	23-juin
Cos	519 m	9 mm		153 mm	1513	1791	1534	30-mai	11-juin	29-juin
Leran-Lourmatel	391 m	1 mm		84 mm	1581	1753	1577	27-mai	8-juin	25-juin
Montaut	295 m	0 mm		117 mm	1686	1721	1608	21-mai	2-juin	19-juin

Repères intervention

	Foin de bonne valeur alimentaire	Foin fibreux
Prairie temporaire	1000 °Cjour	1200 °Cjour
Prairie permanente fertile et précoce	1100 °Cjour	1300 °Cjour
Prairie permanente plus tardive	1200 °Cjour	1600 °Cjour

Repères altitude

-300m	-200m	-100m	Altitude station	+100m	+200m	+300m	+400m
+ 259°Cjour	+ 173°Cjour	+ 86°Cjour	0	- 86°Cjour	- 173°Cjour	- 259°Cjour	- 346°Cjour

Retirez 10°jour si vous êtes situés 100m AU DESSUS de la station (cf. altitude ci dessus) et ajoutez-les si vous êtes 100m plus bas. (sauf pour une parcelle en bas fond). Par exemple, si vous êtes situés à 500m d'altitude et que vous utilisez la station météo de Léran, vous êtes à +100m, la somme de température pour chez vous est de 1581-86 = 1495°jour.

À faire cette semaine

Récolte: Cette semaine, profitez du beau temps pour continuer la récolte de vos fourrages ainsi que les semis de cultures fourragères d'été. Privilégiez le stockage en sec si la fenêtre météo reste bonne. Pensez à faire des prélèvements dans les andains ou à la confection des tas d'ensilage pour les faire analyser cet automne afin d'équilibrer les rations (journée d'analyse organisée par la Chambre d'Agriculture le 9 novembre).

Pâturage: Si les refus sont trop important vous pouvez les faucher/broyer à la sortie des animaux.

Foins

Privilégier une coupe assez haute (7-8 cm) pour faciliter le séchage et pour favoriser la repousse.

Précautions pour enrubannage/ensilage tardifs

Le stade avancé de l'herbe n'est pas favorable à la conservation car le taux de sucre est plus bas et les tiges sont plus ligneuses. Pour améliorer la conservation:

- Pour l'**ensilage**, éviter de trop faire sécher (35% MS maxi), **hacher fin** (2-3 cm) et tasser par couches de 20-30 cm maximum
- Pour l'**enrubannage**, viser **50-60% de MS**, et faire des **balles denses** et **régulières**, ce qui est facilité par un andain de largeur proche de celle du pick-up de la presse et par le **hachage**. **Enrubanner au plus vite après le pressage** : **dans les 2 h par températures élevées**.
- Pour les **méteils** qui n'ont pas encore pu être récoltés, à un stade très avancé**, préférer la récolte en ensilage**, surtout en présence de féverole, ou à défaut un **enrubannage** si la presse permet le **hachage**.

Prélèvement d'herbe à la récolte pour analyse de fourrage

La meilleure analyse ne reflétera jamais plus que l'échantillon qui a été mesuré, un bon échantillonnage est donc primordial pour être représentatif de la qualité d'un fourrage.

Pour un fourrage destiné à l'**ensilage** il est préférable de prélever un échantillon en vert, au moment de la **confection du silo**. L'échantillon est à congeler jusqu'à l'analyse. Les résultats de l'analyse auront une meilleure prédiction de la valeur énergétique et seront disponibles au moment de l'ouverture du silo. La bonne qualité de conservation de l'ensilage pourra être vérifiée sur place avec une mesure du pH.



Échantillonnage d'un ensilage: effectuer 15 prélèvements à différents moments de la confection du silo, à mélanger dans un seau pour en extraire un échantillon de 500 à 700 g.

Pour un **foin** il est préférable de prélever un échantillon **juste avant le pressage**. Échantillonnage pour un foin sur andains, faire 15 prélèvements sur différentes épaisseurs (en haut, au milieu, en bas). Reprendre avec 1 couteau pour en extraire un échantillon de 300 à 500g.

Quelles autres informations sont nécessaires?
Il est important de noter la date de récolte, la nature du fourrage, s'il y a eu déprimage ou non, son cycle de végétation et son stade au moment de la récolte, ainsi que les conditions de récolte et de conservation.

Action financée par:

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale «Développement agricole et rural »

Contact : patrick.beral@ariege.chambagri.fr / sebastien.petitprez@ariege.chambagri.fr

Les préconisations issues de ce bulletin découlent :
- des données météo France sur 4 stations du département
- Des mesures de la pousse de l'herbe faites sur l'exploitation suivie
Vous pouvez consulter ce bulletin sur notre site internet :
www.ariege.chambagri.fr

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE ARIÈGE