n° 3 - 3 mars 2021

Les bulletins fourrages publiés chaque semaine par la chambre d'agriculture présentent l'évolution de la pousse de l'herbe grâce aux « sommes de températures » calculées à partir de 5 stations météoritiques réparties sur le département.



2 mars 2021	Altitude (m)	Précipitations (mm) du au 30 derniers		Somme de températures depuis le 1er février (°C-jour)			cumul obtenu en année moy. le	soit un écart de	cumul obtenu en 2020 le	soit un écart de			prairies tardives	
		24-févr. 2	2-mars	jours	100 may 1 ma	2020	année moy	0.00 M 0.00 M				250 °j	300 °j	400 °j
St-Girons	414 m	16 mi	m	38 mm	280°	259	179	14-mars	-12 jours	3-mars	-1 jours	26-févr.	4-mars	15-mars
Cos	519 m	28 mi	m	51 mm	270°	250	176	14-mars	-12 jours	3-mars	-1 jours	27-févr.	5-mars	17-mars
Leran-Lourmatel	391 m	23 mm		39 mm	259°	220	182	12-mars	-10 jours	6-mars	-4 jours	28-févr.	7-mars	17-mars
Montaut	295 m	21 m	m	32 mm	298°	275	183	16-mars	-14 jours	4-mars	-2 jours	24-févr.	2-mars	12-mars
Mazères Le Massuet	223 m	21 m	m	31 mm	274°	181	-	13-mars	-11 jours	1-mars	1 jours	26-févr.	5-mars	15-mars
Simulation 600m					233°							•		
Simulation 800m					160°									
Simulation 1000m					87°									

Prévisions Météo :

Jeu 04	Ven 05	Sam 06	Dim 07	Lun 08	Mar 09	Mer 10	
16°	14°	12°	14°	10°	10°	160	
8°	9°	5°	2°	3°	1°	16°	

(Données Météo France / Météociel pour Foix actualisées le 3 mars 2021)

Courir après l'herbe est un gage de réussite de la gestion du pâturage

La fraicheur matinale avec quelques gelées ralentissent la pousse de l'herbe. Les premiers troupeaux laitiers, viandes, ovins sont sortis vers la mi-février sur des prairies précoces.

L'on a 2 jours en moyenne d'avance par rapport à l'an passé et 11 jours d'avance sur une année moyenne!!!!



Conseil de la semaine

En zone basse < 500m

Il faut continuer à mettre à l'herbe sur les parcelles précoces avec une transition alimentaire (point de foin). La pousse de l'herbe n'étant pas optimale sur la surface de base, on peut aller déprimer les parcelles de fauches de la surface complémentaire (voir bulletin fourrage n°2 pour organisation gestion pâturage). Il est important de respecter un temps de repousse plus long (environs 28-35 jours) entre une sortie précoce et le 2éme tour. Veillez à ne pas faire racler les parcelles (laisser au moins 5 cm).

Pour les éleveurs bovin viande l'on peut commencer par sortir en premier les génisses.

En zone plus haute 500 à 1000 m

L'on peut commencer à sortir les animaux sur les premières pousses des prairies précoces avec une transition alimentaire longue.



Sortie le 19 février chez Benoît Condé à Taurignan Vieux

Action financée par:

Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR l'aguille l'Astronomies de l'Astronomies de l'Astronomies de la contraction de la contra

Contact: patrick.beral@ariege.chambagri.fr

Les préconisations issues de ce bulletin découlent :

- des données météo France sur 5 stations du département
- des mesures de la pousse de l'herbe faites sur l'exploitation suivie

Vous pouvez consulter ce bulletin sur notre site internet : www.ariege.chambre-agriculture.fr

