N°08 – 12 avril 2023

PROAGRI
POUR VOUS, AUJOURD'HUI ET DEMAIN

BULLETIN FOURRAGE

Les bulletins fourrages publiés chaque semaine par la Chambre d'agriculture présentent l'évolution de la pousse de l'herbe grâce aux « sommes de températures » calculées à partir de 7 stations météo réparties sur le département.

Données météo

9 avril 2023	Altitude (m)	Précipitations (mm) du 3-avr.	au 9-avr.	30 derniers jours	Somme de températures depuis le 1er février (°C-jour) 2023	2022	année moy	Fin déprimage prairies précoces 500 °j	prairies tardives 800 °j	Fin 1er tour de pâture 750 °j	ensilage-enrubanné prairies précoces 800 °j
St-Girons	414 m	1 mm		37 mm	585°	576	532	31-mars	26-avr	22-avr	26-avr
Cos	519 m	2 mm		90 mm	578°	555	497	31-mars	27-avr	23-avr	27-avr
Leran-Lourmatel	391 m	2 mm		85 mm	525°	548	517	6-avr	30-avr	27-avr	30-avr
Montaut	295 m	1 mm		69 mm	626°	632	524	28-mars	22-avr	18-avr	22-avr
Mirepoix	293 m	2 mm		51 mm	559°						
Serres sur Arget	548 m	4 mm		113 mm	519°						
Prades	1535 m	2 mm		92 mm	308°						

Prévisions météo

MER 12	JEU 13	VEN 14	SAM 15	DIM 16	LUN 17	MAR 18
6 ° / 16 °	4 ° / 6 °	5 ° / 12 °	8 ° / 13 °	5 ° / 15 °	7 ° / 19 °	9 ° / 16 °

Zoom sur les sommes de températures du moment

	Mise à l'herbe	Fin déprimage	Ensilage, enrubanné, séchage en grange
Prairie temporaire	250 °C jour	500 °C jour	800 °C jour
Prairie permanente fertile et précoce	300 °C jour	500 °C jour	900 °C jour
Prairie permanente plus tardive	400 °C jour	800 °C jour	1000 °C jour

Conseils de la semaine

Manque d'eau et gelées matinales ont ralenti la pousse de l'herbe !

Les faibles précipitations de la semaine écoulée avec des variations de températures importantes accompagnées de gelées matinales ont ralenti la pousse de l'herbe. Espérons que la pluviométrie annoncée pour les prochains jours avec des températures plus fraîches permettra de mieux optimiser la pousse de l'herbe.
A ce jour, on est sur une année similaire en termes de cumul de sommes de températures à celle de l'année passée. On a une petite semaine d'avance (5 jours) par rapport à la moyenne des 10 dernières années.
En plaine, les 500°c jours sont largement dépassé, il est impératif de sortir les animaux des surfaces de fauches pour ne pas pénaliser la récolte de foin de 30 à 50 %.

On se rapproche de la fin du premier tour de pâture vers le 22 avril (750° j atteint) **avec une explosion de la pousse de d'herbe dans les jours à venir sur les prairies fertiles et précoces à 650°c jours.** Il ne faut pas hésiter à **mettre la pression de pâturage sur la surface de base pour bien étêter les graminées** afin de favoriser la repousse feuillue et de limiter les refus au tour suivant.

Les ensilages de RGI se poursuivent en fonction de chaque objectif éleveur, certains privilégient la qualité, d'autres la quantité.

Le tableau ci-dessous synthétise les caractéristiques des ensilages de RGI en fonction de l'objectif recherché.

Nom	Ensilage herbe riche	Ensilage équilibré	Ensilage vision quantité
Stade et somme de températures (° jour)	Epi 10 cm 550	Epi 20-25 cm 650	Début épiaison 750
Rendement (t MS/ha)	3	4	5
UFL (par kg MS)	0,94	0,88	0,82
MAT (g/kg MS)	160	160	130

Vers 1 000 m d'altitude, les 400°c jours sont dépassé, la fin du déprimage sur les prairies fertiles et précoces est à prévoir fin de semaine, début de semaine prochaine avec les 500°c jours qui devraient être atteint.
Vers 1 500 m d'altitude, les 300°c jours sont atteint la mise à l'herbe peut commencer sur les prairies précoces et fertiles en fonction des conditions météo.

patrick.beral@ariege.chambagri.fr / tara.bate@ariege.chambagri.fr

Les préconisations issues de ce bulletin découlent :
- des données météo France sur 5 stations du département
- des mesures de la pousse de l'herbe faites sur l'exploitation suivie

Vous pouvez consulter ce bulletin sur notre site internet :
www.ariege.chambre-agriculture.fr

Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE
CHAMBRE D'AGRICULTURE
PROAGRI