CHAMBRE D'AGRICULTURE ARIÈGE



BULLETIN FOURRAGE

N°07_28 MARS 2024

ARIEGE.CHAMBRE-AGRICULTURE.FR

Les bulletins fourrages publiés chaque semaine par la Chambre d'Agriculture fournissent des conseils sur la gestion du pâturage et des fourrages. Ces bulletins présentent l'évolution de la pousse de l'herbe à partir des "sommes de températures" calculées à partir de 7 stations météo réparties sur le département de l'Ariège.

patrick.beral@ariege.chambagri.fr / lea.valero@ariege.chambagri.fr

Les préconisations issues de ce bulletin découlent :
- des données météo France sur 5 stations du département
- des mesures de la pousse de l'herbe faites sur l'exploitation suivie

PROaGRI POUR VOUS. AUJOURD'HUI. ET DEMAIN

Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE

CHAMBRE D'AGRICULTURE ARIÈGE

Données Météo

24 mars 2024	Altitude (m)	Précipitations (mm) du 18-mars au 24-mars	Précipitations (mm) 30 derniers jours	Somme de températures depuis le 1er février (°C-jour) 2024	2023	année moy	Mise à l'herbe prairies TP / RGI 250 °j	prairies précoces 300 °j	prairies tardives 400 °j	Fin déprimage prairies précoces 500 °j	prairies tardives 800 °j
St-Girons	414 m	3 mm	90 mm	518°	422	374	27-févr.	6-mars	15-mars	22-mars	19-avr
Cos	519 m	3 mm	147 mm	501°	417	363	27-févr.	6-mars	16-mars	23-mars	20-avr
Leran-Lourmatel	391 m	1 mm	97 mm	474°	376	376	2-mars	9-mars	18-mars	26-mars	23-avr
Montaut	295 m	0 mm	57 mm	522°	455	378	27-févr.	6-mars	15-mars	22-mars	17-avr
Mirepoix	293 m	2 mm	91 mm	511°	401	0	28-févr.	6-mars	15-mars	22-mars	19-avr
Serres sur Arget	548 m	2 mm	113 mm	476°	373	0	1-mars	9-mars	18-mars	26-mars	24-avr
Prades	1535 m	1 mm	52 mm	282°	233	0	20-mars	27-mars	17-avr	26-avr	2-juin

Rappel : La somme TB0 depuis le 1er janvier, est utilisée comme repère pour la fertilisation azotée ; la somme de températures depuis le 1er février est utilisée comme indicateur du stade physiologique des plantes. La somme des températures est donnée en degrés jours (DJ).

Prévisions météo

28 Mars	29 Mars	30 Mars	31 Mars	1 Avr	2 Avr
80%	80%	90%	90%	80%	
6.3 mm	8.7 mm	3 mm	3.5 mm	2.6 mm	
19° / 5°	19° / 6°	17° / 4°	18° / 7°	15° / 7°	19° / 2°
24 - 60 km/h	16 - 60 km/h	12 - 37 km/h	12 - 37 km/h	13 - 47 km/h	11 - 33 km/h
3 Avr	4 Avr	5 Avr	6 Avr	7 Avr	8 Avr
40%	30%				
0.2 mm	0.3 mm				
21° / 7°	20° / 7°	22° / 9°	16° / 9°	21° / 6°	27° / 7°
11 - 26 km/h	1 - 33 km/h	9 - 28 km/h	8 - 27 km/h	9 - 27 km/h	10 - 31 km/h

CHAMBRE D'AGRICULTURE ARIÈGE

Rappel des indicateurs

Type de prairies	Mise à l'herbe	Fin déprimage
Prairies temporaires	250 ° jours	500 ° jours
Prairies permanentes fertiles et précoces	300 ° jours	500 ° jours
Prairies permanentes tardives	400 ° jours	800 ° jours

Conseil de la semaine :

Une année toujours aussi précoce : avec 8 jours d'avance par rapport à l'année précédente et 13 jours d'avance par rapport à une année moyenne (2006-2018).

Les sommes de températures évoluent vite, surtout avec les températures de la semaine dernière qui **accompagnent la pousse de l'herbe**.

En cette fin de semaine, après une faible pluviométrie au cours de la semaine dernière et des quinze derniers jours dans les secteurs de Montaut, Mirepoix et Saint-Girons, nous observons **un sol sec en surface,** ce qui entraîne **un début de stress hydrique** dans certaines zones du département.
Espérons que les pluies de ce début de semaine et celles à venir permettront d'optimiser la croissance de l'herbe.

Les 500° jours sont arrivés en plaine, ce qui signifie que **le déprimage** des prairies temporaires et permanentes fertiles destinées à la fauche **doit s'arrêter d'ici la fin de semaine,** si vous ne voulez pas perdre **30 à 50 % du volume du foin** au détriment de la qualité. Vous devez **faire tourner les animaux sur la surface de base** (de pâturage) et **mettre la pression au pâturage pour étêter** les graminées et favoriser une repousse feuillue.

CHAMBRE D'AGRICULTURE ARIÈGE

Vers le 10 Avril, l'atteinte des 700° jours annonce le début des chantiers d'ensilages de ray-grass italien et hybride, en fonction des objectifs de qualité que vous recherchez.

Ensilage recherché	Riche	Équilibré	Quantité
Stade et sommes de températures (° jour)	Épi de 10 cm 550 ° jour	Épi de 20-25 cm 650 ° jour	Début épiaison 750 ° jour
Rendement (t MS/ha)	3	4	5
UFL (kg MS)	0.84	0.88	0.82
MAT (g/kg MS)	160	160	130

Avec des conditions de pousse hivernale favorables, certains privilégient une coupe précoce de qualité en l'enrubannage, suivi d'une fertilisation azotée en vue d'une seconde récolte.

Sur les exploitations d'altitudes, **à 1000 m, la sortie des animaux doit se poursuivre, avec éventuellement le déprimage** de parcelles de fauches en fonction des conditions météorologiques.

À 1500 m d'altitude, préparez les mises à l'herbe pour fin mars à mi-avril en fonction des conditions météorologiques.

Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE
Liberté Égalité Fraternité

patrick.beral@ariege.chambagri.fr / lea.valero@ariege.chambagri.fr
06 42 92 35 17 06 73 63 86 50

PROaGRI
POUR VOUS. AUJOURD'HUI. ET DEMAIN

Vous pouvez consulter ce bulletin sur notre site internet :
ARIEGE.CHAMBRE-AGRICULTURE.FR