N°2 – 03 avril 2019

• Données météo (Météo France) :

Toujours 2 semaines d'avance par rapport à 2018

Données du **31-mars**	**Précipitations** du 25-mars au 31-mars	**Précipitations** 30 derniers jours	**Cumuls températures** * **2019**	écart par rapport à 2018	**Dates prévisionnelles** **Fin déprimage** prairies précoces 500 °j	**Fin déprimage** prairies tardives 800 °j	**Ensilage ou enrubannage de haute qualité** (début épiaison) prairies précoces 800 °j	**Ensilage ou enrubannage de haute qualité** (début épiaison) prairies précoces 900 °j
Stations météo :								
St-Girons (414m)	0 mm	27 mm	**534 °j**	-14 jours	27-mars	24-avr.	24-avr.	2-mai
Cos (519m)	0 mm	40 mm	**523 °j**	-17 jours	28-mars	27-avr.	27-avr.	5-mai
Leran-Lourmatel (391m)	0 mm	30 mm	**478 °j**	-11 jours	2-avr.	30-avr.	30-avr.	8-mai
Montaut (295m)	0 mm	17 mm	**581 °j**	-15 jours	23-mars	21-avr.	21-avr.	29-avr.

*cumul temp. moyennes journalières depuis 1er février. Prévisions : à partir valeurs moyennes sur 20 à 30 ans

• Ajustements en fonction de l'altitude

+ 100m	+ 200m	+ 300m	+ 400m	+ 500m	+ 600m	+ 700m	+ 800m
-35°Cjour	-70°Cjour	-104°Cjour	-139°Cjour	-174°Cjour	-209°Cjour	-244°Cjour	-278°Cjour

0,6 °C en moins par jour et par tranche de 100 m en plus par rapport à la station de référence

Retirez 35° jour si vous êtes situés 100m AU-DESSUS de la station (ajoutez-les si vous êtes 100m plus bas, sauf pour une parcelle en bas-fond). Par exemple, si vous êtes situés à 800m d'altitude et que vous utilisez la station météo de St-Girons, vous êtes à+400m, la somme de température pour chez vous est de 534-139 = 395°Cjour.

• Prévisions : 2 semaines pluvieuses à venir

Prévisions Météo France pour Foix (au 03/04)

• Conseils de la semaine

- La mise à l'herbe devrait pouvoir être faite jusque vers 1100m sur prairies précoces (800 m sur prairies plus tardives), sous réserve que les parcelles restent portantes.
- En dehors des zones d'altitude le déprimage est à cesser sur les prairies précoces : risque élevé d'avoir une forte perte de rendement en foin (grande quantité d'épis coupés). Plus en altitude il pourra se poursuivre jusque vers le 12 avril vers 800m, 23 avril vers 1000 m.

Zoom sur…

❖ Le déprimage des parcelles de fauche

Le déprimage est une technique qui vise à faire pâturer l'herbe avant que le bourgeon terminal de la plante ne se trouve à 5 cm (on parle alors de stade épi 5 cm), soit vers 500°jour pour les prairies précoces.

Lors d'un déprimage, les animaux pâturent mais ne prélèvent pas l'épi de la plante qui est trop bas dans le couvert, l'épiaison n'est donc pas compromise. Ceci permet de décaler la pousse de l'herbe des parcelles destinées à la fauche et de favoriser le tallage des graminées, en améliorant ainsi la qualité des fourrages produits, sans diminuer le rendement.

Le déprimage ne se justifie par forcément pour les parcelles qui vont être exploitées tôt (parcelles enrubannées, ensilées, ou destinées au séchage en grange). Cette technique, bien qu'intéressante pour améliorer la qualité de l'herbe, ne devra pas être systématisée à l'ensemble des parcelles afin de limiter les risques dus à une éventuelle sécheresse.

En cas de fauche tardive le déprimage permet de diminuer les pertes par sénescence du fourrage récolté et de limiter l'utilisation des stocks en avançant la mise à l'herbe.

❖ Repères

	prairie à flore précoce	prairie à flore tardive
Fin déprimage	**500-550 °Cjour**	**800 °Cjour**

Flore précoce : dactyle, fétuque élevée, fromental, ray-grass italien ou hybride, variétés précoces de ray-grass anglais…

Flore tardive : agrostides, fléole, fétuque rouge…

Les variétés de ray-grass anglais de type intermédiaire à demi-tardif sont entre les deux.



valeurs au kilo de matière sèche	dMO %	UFL	PDIN g	PDIE g	UEL	UEB
Après déprimage repousses 7 semaines	64	0.75	69	85	1.08	1.15
Sans déprimage	59	0.68	64	78	1.14	1.26

Valeur alimentaire d'un foin de prairie permanente (type précoce), avec ou sans déprimage (vers 500°Cj), pour une fauche à la même date (entre épiaison et floraison, vers 1120°Cj). (tables INRA 2007)

L'étêtage

Le déprimage ne doit pas être confondu avec l'étêtage, plus tardif (après 500°jour sur parcelles précoces), au cours duquel l'apex est prélevé par les animaux. Le fourrage récolté suite à un étêtage contient peu de tiges, c'est un fourrage plus feuillu de type regain. La qualité nutritionnelle est très bonne mais le rendement récolté très inférieur à celui d'un foin.

En résumé

	DEPRIMAGE	ETETAGE
DEFINITION	Le futur épi n'est pas coupé par la pâture	Le futur épi est coupé
IMPACT SUR LA REPOUSSE	REPOUSSE REPRODUCTIVE Epiaison décalée d'une semaine, la tige repoussera moins haute, sera plus appétente, et il y aura plus de feuilles	REPOUSSE VEGETATIVE (pour les espèces non remontantes : RGA, dactyle, fétuques, … ; pas pour le RGI, qui fera un épi)
INTERETS	- Favoriser le tallage (densification du gazon) et l'appétence - Optimiser la qualité de foin récolté (moindres pertes de quantités)	- Favoriser les repousses feuillues - Donner la priorité à la qualité de foin (pertes en quantité)

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT
Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale «développement agricole et rural»

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE ARIÈGE