



La culture du framboisier n'est pas techniquement très difficile dans nos régions de montagne du Languedoc-Roussillon. Les facteurs limitants sont souvent les types de sol : terrains acides de préférence, la ressource en eau et surtout le temps de travail nécessaire à la récolte. Cf fiche technico-économique FRAMBOISIER du SUAMME.

## LA TAILLE DES FRAMBOISIERS

La taille des plants permet d'optimiser le rendement et le temps passé à la récolte.

La méthode de taille doit être adaptée aux types de variétés plantées.

Il existe deux sortes de variétés :

### • Les variétés non remontantes :

Elles produisent en juin – juillet et, généralement, sur une durée d'environ trois semaines. Par exemple : Malling Exploit, Malling Promise, Meeker...

Ces variétés produisent sur le bois de l'année précédente.

### • Les variétés remontantes :

Elles produisent à partir de fin juillet pour les plus précoces (par exemple Blissys) ou début août (par exemple Zeva Remontante, Héritage).

La production est étalée et peut être continue durant l'automne jusqu'à ce que de mauvaises conditions climatiques (grosses pluies, froid) l'arrêtent.

Ces variétés produisent sur les pousses de l'année en cours.

Les différences de comportement de ces deux types de variétés ont pour conséquence qu'une erreur dans la méthode de taille peut entraîner une chute de la production qui peut être totale.

**Remarque** : il est important de ne pas mélanger les variétés à la plantation : faire des rangées homogènes par variété, ou au moins par type de variété. Étiqueter les variétés ou noter leur emplacement sur un plan.

Le temps nécessaire à la récolte est optimisé si la taille est correctement faite.

La taille permet d'éliminer les tiges inutiles : non productives, en surnombre, mal placées... Elle permet aussi de contrôler la répartition des cannes dans le rang et leur hauteur, ce qui facilite l'accès aux fruits et donc la rapidité du ramassage.

Rappel :

Le temps de récolte moyen est de 2,5 – 3 kg par heure...

Pour 1 000m<sup>2</sup> et un rendement de 700 kg, la récolte demande 280h.

## Les méthodes de taille


Les méthodes présentées ici répondent aux critères d'une production économiquement valable : coût, rapidité, facilité de mise en œuvre et efficacité. Il existe d'autres méthodes de taille mais qui correspondent généralement à des productions d'amateurs.

### Taille des variétés non remontantes

- En fin d'hiver (février), couper toutes les cannes qui ont déjà produit.
- **Garder environ 15 cannes**, qui ont poussé l'année précédente, par mètre linéaire.

Si nécessaire, les rabattre à environ 1,60m de hauteur.

Ce sont ces tiges qui produiront dans l'année en cours.



### Taille des variétés remontantes

- La taille est simple : en hiver couper toutes les cannes au ras du sol.
- En juin trier les drageons qui ont poussé pour en garder environ 15 par mètre linéaire. Ce sont ces drageons qui vont produire d'août à la fin de l'automne.

