n° 10 – 14 mai 2018

Prévisions météo *(Données Météo France)*

Saint Girons

mar 15	mer 16	jeu 17	ven 18	sam 19	dim 20	lun 21
5 mm	2 mm	1 mm	3 mm	1 mm	5 mm	4 mm
8°C	8°C	9°C	10°C	10°C	9°C	11°C
12°C	18°C	21°C	20°C	20°C	21°C	22°C

Léran

mar 15	mer 16	jeu 17	ven 18	sam 19	dim 20	lun 21
4 mm	2 mm	0 mm	1 mm	0 mm	4 mm	2 mm
8°C	8°C	9°C	10°C	9°C	9°C	10°C
13°C	18°C	21°C	19°C	20°C	22°C	22°C

Cos

mar 15	mer 16	jeu 17	ven 18	sam 19	dim 20	lun 21
5mm	2 mm	0 mm	0 mm	0 mm	4 mm	3 mm
7°C	8°C	9°C	10°C	10°C	10°C	11°C
12°C	17°C	20°C	19°C	20°C	21°C	22°C

Montaut

mar 15	mer 16	jeu 17	ven 18	sam 19	dim 20	lun 21
5 mm	2 mm	3 mm	1 mm	0 mm	3 mm	3 mm
8°C	8°C	9°C	10°C	9°C	9°C	11°C
12°C	18°C	20°C	19°C	19°C	21°C	21°C

À retenir :

Le début et la fin de la semaine dernière ont été particulièrement pluvieux, avec localement de la grêle en plaine et de la neige à partir de 1000m. Les températures moyennes journalières ont aussi été en dent de scie.

Cela a laissé une fenêtre en milieu de semaine pour faire des récoltes précoces en enrubannage/ensilage sur les prairies temporaires et les prairies permanentes précoces.

Données météo *(Données Météo France)*

13 mai 2018	Altitude (m)	Précipitations (mm) du 7-mai	Précipitations (mm) au 13-mai	Précipitations (mm) 30 derniers jours	Somme de températures (°C-jour) 2018	Somme de températures (°C-jour) 2017	Somme de températures (°C-jour) année moy	Enrubannage précoce 800 °j	Enrubannage 900 °j	Fauche précoce 1100 °j
St-Girons	414 m	89 mm		181 mm	917	1181	952	4-mai	11-mai	25-mai
Cos	519 m	63 mm		121 mm	845	1077	884	8-mai	16-mai	30-mai
Leran-Lourmatel	391 m	68 mm		118 mm	881	1048	918	6-mai	14-mai	27-mai
Montaut	295 m	50 mm		95 mm	968	1006	941	30-avr	7-mai	21-mai

Repères intervention

	Mise à l'herbe	Fin déprimage	Ensilage, enrubanné, séchage en grange	Foin de bonne valeur alimentaire
Prairie temporaire	250 °Cjour	500 °Cjour	800 °Cjour	1000 °Cjour
Prairie permanente fertile et précoce	300 °Cjour	500 °Cjour	900 °Cjour	1100 °Cjour
Prairie permanente plus tardive	400 °Cjour	800 °Cjour	1000 °Cjour	1200 °Cjour

Repères altitude

-300m	-200m	-100m	Altitude station	+100m	+200m	+300m	+400m
+ 182°Cjour	+ 121°Cjour	+ 61°Cjour	0	- 61°Cjour	- 121°Cjour	- 182°Cjour	- 242°Cjour

Retirez 10°jour si vous êtes situés 100m AU DESSUS de la station (cf. altitude ci dessus) et ajoutez-les si vous êtes 100m plus bas. (sauf pour une parcelle en bas fond). Par exemple, si vous êtes situés à 500m d'altitude et que vous utilisez la station météo de Léran, vous êtes à +100m, la somme de température pour chez vous est de 881-61 = 820°jour.

À faire cette semaine

Cette semaine, le cumul de 1000°Cj depuis le 1er février devraient être atteints dans certaines zones en plaine. Il sera donc temps d'ensiler/enrubanner les prairies permanentes composées de graminées productives si une fenêtre de 3 jours de beau temps se précise.

Récolter au stade optimum et assurer son stock malgré les conditions climatiques difficiles

- Pour profiter au mieux des rares périodes météo favorables à la fauche, quelques **solutions pour faciliter un séchage rapide** et atteindre le plus rapidement possible 30-35% de matière sèche pour un ensilage, 45-50% pour un enrubannage :
  - o **Faucher en fin de matinée**, après la rosée
  - o Augmenter la **hauteur de fauche : 7-8 cm** facilite le séchage, et la repousse sera plus rapide)
  - o Maximiser la surface d'exposition au soleil sitôt la fauche : **fanage dès que possible**, **sauf si** la faucheuse laisse des **andains larges** (80% de la surface couverte)

Savoir reconnaître la teneur en matière sèche d'un fourrage (MS)	
20 % MS	Le jus s'écoule en pressant à la main une poignée d'herbe.
25 % MS	Le jus s'écoule en tordant à la main une poignée d'herbe.
30 % MS	En tordant une poignée, les doigts s'humidifient de quelques gouttes.
35 % MS	En tordant une poignée, les doigts s'humidifient mais sans goutte.
40 % MS	Pas d'humidité sur les doigts en tordant les feuilles.

- Méteils : le **triticale est épié** dans de nombreuses parcelles semées précocement. Ces parcelles sont à récolter rapidement, surtout en cas d'enrubannage non haché (risque de refus plus élevé avec un triticale à un stade avancé). La récolte peut être retardée pour gagner en rendement si les protéagineux sont très présents (plus de 40-50%), surtout si la récolte a lieu en ensilage ou enrubannage haché.
- Avec les pluies annoncées, un apport de **30-40 unités d'azote** (ammonitrate de préférence) **sur les prairies de graminées qui viennent d'être fauchées** ou pâturées sera bien valorisé et permettra une repousse plus importante. L'utilisation d'azote soufré ne se justifie généralement pas à cette période.
- Profitez aussi des pluies pour **ébouser** sur les prairies portantes: cela permet une **repousse plus homogène** par meilleure répartition des éléments minéraux et moins de refus, mais aussi de remettre en état les parcelles abimées par des conditions de pâturage trop humides.

Action financée par:

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale «Développement agricole et rural »

Contact : patrick.beral@ariege.chambagri.fr / sebastien.petitprez@ariege.chambagri.fr

Les préconisations issues de ce bulletin découlent :
- des données météo France sur 4 stations du département
- Des mesures de la pousse de l'herbe faites sur l'exploitation suivie

Vous pouvez consulter ce bulletin sur notre site internet :
www.ariege.chambagri.fr

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE ARIÈGE