Bulletin fourrage

n° 15 – 18 juin 2018

Prévisions météo *(Données Météo France)*

Saint Girons

	mar 19	mer 20	jeu 21	ven 22	sam 23	dim 24	lun 25
	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	1 mm	4 mm	2 mm
	14°C	15°C	17°C	17°C	17°C	16°C	16°C
	26°C	30°C	29°C	26°C	27°C	28°C	30°C

Léran

	mar 19	mer 20	jeu 21	ven 22	sam 23	dim 24	lun 25
	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	2 mm	1 mm
	15°C	16°C	18°C	17°C	17°C	16°C	17°C
	26°C	30°C	30°C	27°C	27°C	28°C	29°C

Cos

	mar 19	mer 20	jeu 21	ven 22	sam 23	dim 24	lun 25
	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	3 mm	1 mm
	15°C	15°C	17°C	17°C	17°C	16°C	17°C
	25°C	29°C	29°C	27°C	27°C	28°C	29°C

Montaut

	mar 19	mer 20	jeu 21	ven 22	sam 23	dim 24	lun 25
	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	2 mm	1 mm
	16°C	16°C	18°C	18°C	18°C	17°C	17°C
	26°C	31°C	31°C	28°C	28°C	29°C	29°C

À retenir :

La fin de semaine dernière a été plus clémente sur une bonne partie du département. La récolte des fourrages à pu reprendre sur les sols ressuyés.

Cette semaine, le beau temps semble prévu jusqu'à vendredi voire plus, les travaux de saison vont enfin pouvoir se faire.

Les sommes de température ont dépassé les 1400°Cj en plaine, les fourrages seront fibreux.

En montagne, les 1000°Cj sont atteints à 900m, il est donc temps de faucher les prairies précoces.

Données météo *(Données Météo France)*

17 juin 2018	Altitude (m)	Précipitations (mm) du 11-juin	au 17-juin	30 der n. J.	Somme de températures (°C-jour) 2018	2017	année moy	Fauche précoce 1100 °j	Fin 2° tour de pâture 1150 °j	fauche tardive 1300 °j	Foin fibreux prairie tardive 1600 °j
St-Girons	414 m	53 mm	149 mm		1481	1785	1507	25-mai	28-mai	6-juin	23-juin
Cos	519 m	31 mm	169 mm		1388	1665	1417	30-mai	2-juin	11-juin	29-juin
Leran-Lourmatel	391 m	14 mm	90 mm		1455	1627	1459	27-mai	30-mai	8-juin	25-juin
Montaut	295 m	20 mm	119 mm		1560	1595	1491	21-mai	24-mai	2-juin	19-juin

Repères intervention

	Foin de bonne valeur alimentaire	Foin fibreux
Prairie temporaire	1000 °Cjour	1200 °Cjour
Prairie permanente fertile et précoce	1100 °Cjour	1300 °Cjour
Prairie permanente plus tardive	1200 °Cjour	1600 °Cjour

Repères altitude

-300m	-200m	-100m	Altitude station	+100m	+200m	+300m	+400m
+ 247°Cjour	+ 164°Cjour	+ 82°Cjour	0	- 82°Cjour	- 164°Cjour	- 247°Cjour	- 329°Cjour

Retirez 10°jour si vous êtes situés 100m AU DESSUS de la station (cf. altitude ci dessus) et ajoutez-les si vous êtes 100m plus bas. (sauf pour une parcelle en bas fond). Par exemple, si vous êtes situés à 500m d'altitude et que vous utilisez la station météo de Léran, vous êtes à +100m, la somme de température pour chez vous est de 1455-82 = 1373°jour.

À faire cette semaine

Récolte: Cette semaine, une bonne fenêtre météo semble se confirmer, profitez en pour avancer la fauche, mais attendez que les sols soient ressuyés pour ne pas marquer vos prairies, ce qui est d'autant plus long que la végétation est dense et parfois versée. Adaptez votre vitesse de coupe au volume fauché. Pour de l'ensilage/enrubannage, le stade avancé n'est pas favorable à la conservation, veillez à limiter la présence d'air.

Pâturage: Vous devez être dans votre 3ème tour de pâturage, si les refus sont trop important vous pouvez les faucher/broyer à la sortie des animaux

Précautions pour enrubannage/ensilage tardifs

Le stade avancé de l'herbe n'est pas favorable à la conservation car le taux de sucre est plus bas et les tiges sont plus ligneuses. Pour améliorer la conservation:

- Pour l'**ensilage**, éviter de trop faire sécher (35% MS maxi), **hacher fin** (2-3 cm) et tasser par couches de 20-30 cm maximum
- Pour l'**enrubannage**, viser **50-60% de MS**, et faire des **balles denses** et **régulières**, ce qui est facilité par un andain de largeur proche de celle du pick-up de la presse et par le **hachage**. **Enrubanner au plus vite après le pressage** : **dans les 2 h par températures élevées**.
- Pour les **méteils** qui n'ont pas encore pu être récoltés, à un stade très avancé**, préférer la récolte en ensilage**, surtout en présence de féverole, ou à défaut un **enrubannage** si la presse permet le **hachage**.

Point d'actualité sur l'exploitation suivi



Avec parcelles débrayées, le profil de pâturage se rapproche des objectifs de hauteur d'herbe sur les parcelles restant dans le circuit de pâturage.

Au vu des hauteurs d'herbe importantes à l'entrée des animaux dans la parcelle, certaines sont recoupées en 2 pour limiter le gaspillage.

Un broyage ou une fauche des refus sera à prévoir à la sortie des animaux sur l'une des parcelles.

Au niveau de la récolte des fourrages, la fenêtre météo de la semaine dernière à permis d'avancer sur les terres portantes, mais 7,5 ha de prairie précoces ne sont toujours pas accessible, la qualité récoltée sur ces parcelles laissera surement à désirer.

Les semis auront aussi été compliqué, une croute de battance s'étant formée sur la parcelle de sorgho qui a pu être semée mais pas roulée.

Action financée par:

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale «Développement agricole et rural »

Contact : patrick.beral@ariege.chambagri.fr / sebastien.petitprez@ariege.chambagri.fr

Les préconisations issues de ce bulletin découlent :
- des données météo France sur 4 stations du département
- Des mesures de la pousse de l'herbe faites sur l'exploitation suivie
Vous pouvez consulter ce bulletin sur notre site internet :
www.ariege.chambagri.fr

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE ARIÈGE