n° 17 – 02 juillet 2018

Prévisions météo *(Données Météo France)*

Saint Girons

mar 03	mer 04	jeu 05	ven 06	sam 07	dim 08	lun 09
3 mm	14 mm	10 mm	2 mm	0 mm	5 mm	3 mm
17°C	17°C	15°C	15°C	15°C	16°C	17°C
29°C	27°C	23°C	25°C	27°C	28°C	30°C

Léran

mar 03	mer 04	jeu 05	ven 06	sam 07	dim 08	lun 09
3 mm	9 mm	6 mm	2 mm	0 mm	4 mm	2 mm
15°C	17°C	14°C	15°C	15°C	17°C	17°C
29°C	29°C	23°C	25°C	28°C	29°C	31°C

Cos

mar 03	mer 04	jeu 05	ven 06	sam 07	dim 08	lun 09
3 mm	9 mm	7 mm	4 mm	1 mm	5 mm	3 mm
16°C	17°C	15°C	16°C	16°C	17°C	18°C
28°C	28°C	22°C	25°C	27°C	28°C	30°C

Montaut

mar 03	mer 04	jeu 05	ven 06	sam 07	dim 08	lun 09
3 mm	11 mm	8 mm	3 mm	1 mm	4 mm	2 mm
18°C	19°C	17°C	16°C	17°C	18°C	19°C
31°C	29°C	23°C	26°C	29°C	30°C	32°C

À retenir :

Après une semaine chaude qui a permis de bien avancer sur les travaux de fenaison, une semaine plus agitée s'annonce avec des précipitations notamment mercredi et jeudi.

Les sommes de température ont dépassé les 1600°Cj en plaine, il n'est plus judicieux aujourd'hui de se servir de cet indicateur car les stades de végétation sont dépassés pour tous les types de prairies.

En montagne, les 1300°Cj seront atteints à 900m cette semaine, il est temps de faucher avant que les valeurs alimentaires des fourrages diminuent.

Données météo *(Données Météo France)*

24 juin 2018	Altitude (m)	Précipitations (mm) du 25-juin	au 01-juillet	30 dern. J.	Somme de températures (°C-jour) 2018	2017	année moy	Fauche précoce 1100 °j	fauche tardive 1300 °j	Foin fibreux prairie tardive 1600 °j
St-Girons	414 m	4 mm	91 mm		1732	2030	1756	28-mai	6-juin	23-juin
Cos	519 m	0 mm	97 mm		1639	1906	1656	2-juin	11-juin	28-juin
Leran-Lourmatel	391 m	9 mm	57 mm		1707	1867	1697	30-mai	8-juin	25-juin
Montaut	295 m	0 mm	86 mm		1812	1838	1727	24-mai	2-juin	19-juin

Repères intervention

	Foin de bonne valeur alimentaire	Foin fibreux
Prairie temporaire	1000 °Cjour	1200 °Cjour
Prairie permanente fertile et précoce	1100 °Cjour	1300 °Cjour
Prairie permanente plus tardive	1200 °Cjour	1600 °Cjour

Repères altitude

-300m	-200m	-100m	Altitude station	+100m	+200m	+300m	+400m
+ 272°Cjour	+ 181°Cjour	+ 91°Cjour	0	- 91°Cjour	- 181°Cjour	- 272°Cjour	- 362°Cjour

Retirez 10°jour si vous êtes situés 100m AU DESSUS de la station (cf. altitude ci dessus) et ajoutez-les si vous êtes 100m plus bas. (sauf pour une parcelle en bas fond). Par exemple, si vous êtes situés à 500m d'altitude et que vous utilisez la station météo de Léran, vous êtes à +100m, la somme de température pour chez vous est de 1707-91 = 1616°jour.

À faire cette semaine

Récolte: Cette semaine il faudra prendre en compte localement les précipitations prévues et attendre la prochaine fenêtre météo pour reprendre la récolte des fourrages. Identifiez les différentes qualités de fourrage que vous stockez pour pouvoir les attribuer en fonction des besoins de chaque lot d'animaux.

Pâturage: Avec le retour des fortes chaleurs, la pousse de l'herbe ralentie. Il est temps de passer à une stratégie estivale en ralentissant le rythme de passage des animaux.

Pâturage d'été : éviter le surpâturage

Pour éviter de surpâturer les prairies (ne pas raser en-dessous de 5-6 cm), et préserver leur potentiel de repousse au retour des pluies :

- En pâturage tournant, **ralentir le rythme de passage** des animaux sur les parcelles en agrandissant les surfaces (pâture sur les regains) tout en maintenant un pâturage tournant.
- Augmenter assez tôt la complémentation ou l'affouragement.
- Quand la pousse s'arrête, **éviter de laisser les animaux circuler sur l'ensemble de la surface** et brouter le moindre brin d'herbe qui redémarre : choisir une parcelle dégradée pour en faire une « **parcelle parking** », de préférence avec de l'ombre, **pour affourager** en restant vigilant sur l'abreuvement. Cette parcelle sera « sacrifiée « pour préserver les autres et pourra être rénovée.

Suivi de l'exploitation à Lorp Sentaraille



Le pâturage tournant se poursuit sur 6 parcs. Les 2 autres parcs sont actuellement débrayés et vont être fauchés rapidement. Sur certains parcs les refus commencent à s'accumuler comme le voit sur la photo ci-contre. Un broyage va être fait à la sortie des animaux.

Erreur dans le Bulletin n°16: Dans le bulletin précédent, il vous était conseillé de faire des prélèvements d'herbe lors de la confection du silo d'ensilage, or le prestataire qui intervient lors de la journée d'analyse ne fait des analyses que sur les fourrages secs ou fermentés. Si vous voulez faire analyser vos ensilages lors de cette journée il faudra donc faire un prélèvement dans le silo et le conserver au congélateur jusqu'à l'analyse.

Action financée par:

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale «Développement agricole et rural »

Contact : patrick.beral@ariege.chambagri.fr / sebastien.petitprez@ariege.chambagri.fr

Les préconisations issues de ce bulletin découlent :
- des données météo France sur 4 stations du département
- Des mesures de la pousse de l'herbe faites sur l'exploitation suivie

Vous pouvez consulter ce bulletin sur notre site internet :
www.ariege.chambagri.fr

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE ARIÈGE