Bulletin fourrage

n° 18 – 10 juillet 2018

Prévisions météo *(Données Météo France)*

Saint Girons

mer 11	jeu 12	ven 13	sam 14	dim 15	lun 16
0 mm	2 mm	1 mm	0 mm	9 mm	9 mm
16°C	15°C	15°C	17°C	17°C	16°C
29°C	27°C	30°C	29°C	27°C	24°C

Léran

mer 11	jeu 12	ven 13	sam 14	dim 15	lun 16
0 mm	1 mm	0 mm	0 mm	6 mm	9 mm
17°C	14°C	15°C	17°C	17°C	16°C
29°C	27°C	31°C	31°C	29°C	25°C

Cos

mer 11	jeu 12	ven 13	sam 14	dim 15	lun 16
0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	7 mm	10 mm
17°C	15°C	15°C	18°C	18°C	16°C
27°C	26°C	30°C	30°C	28°C	24°C

Montaut

mer 11	jeu 12	ven 13	sam 14	dim 15	lun 16
0 mm	1 mm	0 mm	0 mm	7 mm	10 mm
19°C	16°C	18°C	19°C	19°C	17°C
30°C	28°C	32°C	32°C	30°C	26°C

À retenir :

La semaine dernière a été marquée localement par de violents orages voire par des chutes de grêle.

Au niveau de la récolte des fourrages, la majorité des exploitations sont à jour avec des volumes importants mais une qualité inégale selon le stade de récolte et la présence ou non de regain dans le foin.

Cette semaine le beau temps devrait se maintenir jusqu'au weekend.

Sommes de température

A partir de maintenant le suivi des sommes de températures n'est plus un indicateur pertinent pour la gestion des fourrages, se sont surtout les précipitations qui décideront de la pousse de l'herbe. Le Bulletin fourrage ne sera donc plus forcement hebdomadaire mais nous continuerons de vous envoyer des articles de saison en fonction des besoins.

Point sur la situation de l'année

Fourrage: L'exploitation tardive de l'herbe ce printemps donnera des fourrages grossiers et de moindre valeur alimentaire ; ils seront à réserver si possible à des animaux à faibles besoins (femelles taries ou non suitées, génisses avec des objectifs de croissance limités, béliers hors période de lutte, …).

Le maintien du niveau de production demandera une complémentation importante, ou une perte d'état du bétail, pour compenser le manque de densité nutritive de cette herbe « passée ».

Il importera donc de faire un **bilan fourrager** (= état des stocks et des besoins) en fin dété et d'**identifier les différents types de fourrages stockés**, afin de pouvoir les destiner aux animaux en fonction de leurs besoins physiologiques respectifs et de prendre si nécessaire les mesures adéquates (achats de fourrages).

Une **analyse de valeur alimentaire** complétera idéalement l'information, pour anticiper les nécessaires ajustements des rations. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos conseillers d'élevage pour vous y aider.

Pâturage: Avec le retour des fortes chaleurs, la pousse de l'herbe ralentie. Il est temps de passer à une stratégie estivale en ralentissant le rythme de passage des animaux.

Action financée par:

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale «Développement agricole et rural»

Contact : patrick.beral@ariege.chambagri.fr / sebastien.petitprez@ariege.chambagri.fr

Les préconisations issues de ce bulletin découlent :
- des données météo France sur 4 stations du département
- Des mesures de la pousse de l'herbe faites sur l'exploitation suivie

Vous pouvez consulter ce bulletin sur notre site internet :
www.ariege.chambagri.fr