

n° 6 – 09 avril 2018

Prévisions météo (Données Météo France)



À retenir :

Données météo (Données Météo France)

La semaine passée a été relativement clémente avec des températures de saison et une faible pluviométrie, excepté dimanche où il a plu jusqu'à 36 mm à Léran.

Les 400°j ont été atteints sur les 4 stations suivies.

La mise à l'herbe doit être faite en plaine là où les prairies sont portantes.

Cette semaine devrait voir se succéder de faibles épisodes pluvieux et une journée plus humide mercredi avec 25 mm de prévu.

8 avril 2018	Altitude (m)	Précipitations (mm)			Somme de températures (°C-jour)			Mise à l'herbe		Max déprimage	
		du 2-avr.	au 8-avr.	30 derniers jours	2018	2017	année moy	300 °j	400 °j	500 °j	600 °j
St-Girons	414 m	7 mm	91 mm	468	707	535	21-mars	2-avr	11-avr	20-avr	
Cos	519 m	24 mm	121 mm	421	649	491	26-mars	6-avr	16-avr	25-avr	
Léran-Lourmatel	391 m	40 mm	140 mm	444	626	511	24-mars	4-avr	13-avr	23-avr	
Montaut	295 m	26 mm	91 mm	496	595	517	17-mars	31-mars	8-avr	18-avr	

Repères intervention

	Mise à l'herbe	Fin déprimage
Prairie temporaire	250 °Cjour	500 °Cjour
Prairie permanente fertile et précoce	300 °Cjour	500 °Cjour
Prairie permanente plus tardive	400 °Cjour	800 °Cjour

Repères altitude

-300m	-200m	-100m	Altitude station	+100m	+200m	+300m	+400m
+ 121°Cjour	+ 80°Cjour	+ 40°Cjour	0	- 40°Cjour	- 80°Cjour	- 121°Cjour	- 161°Cjour


Retirez 10°jour si vous êtes situés 100m AU DESSUS de la station (cf. altitude ci dessus) et ajoutez-les si vous êtes 100m plus bas. (sauf pour une parcelle en bas fond). Par exemple, si vous êtes situés à 500m d'altitude et que vous utilisez la station météo de Léran, vous êtes à +100m, la somme de température pour chez vous est de 444-40 = 404°jour.

À faire cette semaine

Cette semaine, les 500°j devraient être atteints. Cette somme de température indique la limite entre le déprimage et l'étêtage sur les prairies précoces, il faut donc arrêter de pâturer les prairies destinées à la fauche sous peine de pénaliser le rendement.

Différence entre déprimage et étêtage

	DEPRIMAGE	ETETAGE
DEFINITION	Le futur épi n'est pas coupé par la pâture	Le futur épi est coupé
IMPACT SUR LA REPOUSSE	REPOUSSE REPRODUCTIVE Epiaison décalée d'une semaine, la tige repoussera moins haute, sera plus appétente, et il y aura plus de feuilles	REPOUSSE VEGETATIVE (pour les espèces non remontantes : RGA, dactyle, fétuques, ... ; pas pour le RGI et un brome, qui referont un épi)
INTERETS	- Favoriser le tallage (densification du gazon) et l'appétence - Optimiser la qualité de foin récolté (moindres pertes de quantités)	- Favoriser les repousses feuillues - Donner la priorité à la qualité de foin (pertes en quantité)



Pour les prairies de fauche déprimées, il est donc important d'arrêter le pâturage avant 500^j, avant que l'épi ne monte trop dans la gaine et soit coupé, sinon la repousse sera feuillue mais le rendement divisé par deux

Action financée
par:



Contact : patrick.beral@ariego.chambagri.fr / sebastien.petitprez@ariego.chambagri.fr

Les préconisations issues de ce bulletin découlent :

- des données météo France sur 4 stations du département
- Des mesures de la pousse de l'herbe faites sur l'exploitation suivie

Vous pouvez consulter ce bulletin sur notre site internet :

www.ariego.chambagri.fr

