BULLETIN FOURRAGE

n° 19 – 2 juillet 2020

Données météo

28 juin 2020	Altitude (m)	Précipitations (mm) du 22-juin au 28-juin	Précipitations (mm) 30 derniers jours	Somme de températures **depuis le 1er février** (°C-jour) **2020**	2019	année moy
St-Girons	414 m	**17 mm**	**104 mm**	**1927°**	1733	1722
Cos	519 m	**13 mm**	**103 mm**	**1860°**	1694	1610
Leran-Lourmatel	391 m	**1 mm**	**75 mm**	**1886°**	1677	1652
Montaut	295 m	**3 mm**	**53 mm**	**2022°**	1855	1683
Mazères Le Massuet	223 m	**1 mm**	**44 mm**	**2015°**	181	-

Altitude :

Simulation 600m	**1752°**
Simulation 800m	**1536°**
Simulation 1000m	**1320°**

La semaine dernière a été peu pluvieuse pour l'Est et le Nord du département. Du côté de Saint-Girons et de Cos, une quinzaine de milimètres de précipitations sont tombés entre le jeudi 25 et le vendredi 26 juin.
Les températures étaient à la hausse avec des moyennes qui ont oscillé entre 20 et 24 °C selon les zones. Le maximum de température (32,4°C) a été enregistré à Saint-Girons le mercredi 24 juin.

Les températures moyennes devraient se maintenir pour les prochains jours. Quelques averses seront à prévoir en début de semaine prochaine.

Repères en sommes de températures :

	Ensilage, enrubanné, séchage en grange	Foin de bonne valeur alimentaire	Foin fibreux
Prairie temporaire	800 °C jour	1000 °C jour	1200 °C jour
Prairie permanente fertile et précoce	900 °C jour	1100 °C jour	1300 °C jour
Prairie permanente plus tardive	1000 °C jour	1200 °C jour	1600 °C jour

Prévisions Météo :



(Données Météo France / Météociel pour Foix actualisées le 1er juillet 2020)

En période estivale, les sommes de températures ne constituent plus un élément fiable au-delà de 1600°j. Ce sont principalement les précipitations qui influent sur la pousse de l'herbe.

Le bulletin fourrage ne paraîtra donc plus de manière hebdomadaire mais nous continuerons à vous envoyer des articles de saison en lien avec l'actualité.

Conseils de la semaine

Les récoltes de foin se poursuivent en altitude au-delà de 800m d'altitude. Il faudra attendre une fenêtre de beau temps assez longue pour réaliser la récolte en sec.

Côté pâturage, pensez à rallonger le temps de repousse des prairies **à 30j**.

C'est le moment d'implanter des cultures fourragères d'été en dérobée qui vous permettront de produire des fourrages complémentaires, de réduire les coûts d'alimentation en été et d'améliorer votre autonomie alimentaire.

Fourrages estivaux : le mûrier blanc

Les cultures fourragères d'été constituent un bon moyen de bénéficier de ressources fourragères en périodes estivale et automnale, lorsque la croissance de l'herbe est fortement ralentie par la chaleur. Elles représentent de véritables compléments alimentaires qui permettent de préserver les stocks pour l'hiver et d'améliorer l'autonomie alimentaire des exploitations. Elles participent à rendre les systèmes plus résilients face au changement climatique.

Dans le cadre du projet Agrosyl, une étude a été menée sur l'implantation et l'utilisation du mûrier blanc comme ressource fourragère.

Traditionnellement utilisée pour l'élevage des vers à soie, puis en fourrage pour le bétail en Amérique du Sud et en Amérique latine, c'est une plante tolérante à la sécheresse qui supporte les températures élevées. Le mûrier blanc peut continuer sa croissance jusqu'à 38°C, contrairement à la plupart des plantes qui stoppent leur développement au-delà de 32°C.

Cette plante présente de bonnes valeurs alimentaires puisqu'elle est riche en matière azotée (17% en moyenne) et possède une excellente valeur énergétique (digestibilité enzymatique de plus de 85%).

Il est possible de faire une récolte en ensilage mais le mode d'exploitation le plus pratique reste le pâturage par les animaux.

En 2017, 5000 plants de mûriers blancs ont été plantés sur une parcelle expérimentale de 0,2 ha au GAEC Authier, élevage bovin viande en Agriculture Biologique à Mirepoix. La plantation a été réalisée au printemps 2017.

Au printemps, la gestion de l'enherbement de la parcelle de mûriers blancs est faite par pâturage.

→ 20t de matière fraîche/ha disponible au 18 juin sur la parcelle (prairie + feuilles de mûriers)

La parcelle de mûriers en été (juillet 2018)

Le pâturage des mûriers en automne

(octobre 2018)

Pour plus d'informations, de photos et de résultats sur les mûriers blancs, rendez-vous sur la page Facebook Bois Paysan.

La Chambre d'agriculture met à votre disposition des sondes pour mesurer la température de vos balles.

Adressez-vous à :

Sonia Rastoueix pour l'antenne de Foix (sonia.rastoueix@ariege.chambagri.fr)

Nina Machard pour l'antenne de Saint-Girons (nina.marchard@ariege.chambagri.fr)

Action financée par:

Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale «développement agricole et rural»

Contact : estelle.dubarry@ariege.chambagri.fr / patrick.beral@ariege.chambagri.fr

Les préconisations issues de ce bulletin découlent :

- *des données météo France sur 5 stations du département*
- *des mesures de la pousse de l'herbe faites sur l'exploitation suivie*

Vous pouvez consulter ce bulletin sur notre site internet :
www.ariege.chambre-agriculture.fr

AGRICULTURES & TERRITOIRES CHAMBRE D'AGRICULTURE ARIÈGE