BULLETIN FOURRAGE

n° 12 – 6 mai 2021

Les bulletins fourrages publiés chaque semaine par la chambre d'agriculture présentent l'évolution de la pousse de l'herbe grâce aux « sommes de températures » calculées à partir de 5 stations météo réparties sur le département.

Données météo

4 mai 2021	Altitude (m)	Précipitations (mm) du 28-avr.	au 4-mai	30 derniers jours	Somme de températures depuis le 1er février (°C-jour) 2021	2020	année moy	Foin fibreux prairie très précoce 900 °j	Foin de qualité prairies précoces 1100 °j
St-Girons	414 m	20 mm		49 mm	901°	910	838	3-mai	16-mai
Cos	519 m	29 mm		60 mm	860°	884	764	6-mai	19-mai
Leran-Lourmatel	391 m	26 mm		48 mm	854°	845	795	6-mai	19-mai
Montaut	295 m	16 mm		41 mm	970°	986	812	28-avr	11-mai
Mazères Le Massuet	223 m	11 mm		34 mm	957°	181	-	29-avr	12-mai
Simulation 600m					785°				
Simulation 800m					636°				
Simulation 1000m					488°				

Prévisions Météo :

(Données Météo France / Météociel pour Foix actualisées le 5 mai 2021)

Conseils de la semaine

Le retour de la pluie, même s'il est insuffisant (de 11 à 29mm), avec des températures douces annoncées jusqu'à dimanche devrait permettre une pousse optimale de l'herbe.

Zoom sur les sommes de températures du moment :

	Fin déprimage	Ensilage, enrubanné, séchage en grange	Foin de bonne valeur alimentaire
Prairie temporaire	500 °C jour	800 °C jour	1000 °C jour
Prairie permanente fertile et précoce	500 °C jour	900 °C jour	1100 °C jour
Prairie permanente plus tardive	800 °C jour	1000 °C jour	1200 °C jour

Sur les exploitations inférieures à 500 m d'altitude

Les 900°j sont atteints, même dépassés sur certains secteurs. Les graminées ont épié; pour préserver la qualité des fourrages, **il vaut mieux faucher et jouer la repousse.**

Coté pâturage la croissance de l'herbe va s'accélérer, il faut veiller à réduire sa surface de base surtout si on l'a agrandi avec l'introduction de parcelles réservées à la fauche quand la croissance de l'herbe était pratiquement à l'arrêt.

Avec une croissance faible de l'herbe ce début de printemps, **favoriser la croissance par un apport d'azote à faible dose (30u/ha) avant la pluie en sortie de pâture ou après une fauche** stimulerait la pousse de l'herbe et conforterait l'autonomie fourragère.

Sur les exploitations à plus de 600 et 800 m d'altitude

Les 800°j vont bientôt être atteints, les ensilages vont pouvoir commencer en fonction des conditions météo pour des fourrages de qualités.

Sur les exploitations à plus de 1000 m

On va atteindre les 500°cj, il faut anticiper la fin du déprimage

Remarque:

Au vu de la situation, faible croissance d'herbe, volume de foin en baisse, il peut être envisagé des cultures dérobées pour cet été derrière un méteil ensilé ou une prairie très dégradée sous réserve d'avoir suffisamment d'eau pour les faire démarrer.

Consultez la note technique :
les cultures fourragères d'été.

Action financée par:

Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
Liberté
Égalité
Fraternité

Contact : patrick.beral@ariege.chambagri.fr

Les préconisations issues de ce bulletin découlent :

- *des données météo France sur 5 stations du département*
- *des mesures de la pousse de l'herbe faites sur l'exploitation suivie*

Vous pouvez consulter ce bulletin sur notre site internet :
www.ariege.chambre-agriculture.fr

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE ARIÈGE