BULLETIN FOURRAGE

n° 1 – 25 février 2020

La campagne de pâturage 2020 va bientôt démarrer, ce qui annonce le retour du bulletin fourrage. Cette année, nous suivrons l'exploitation … Comme vous avez pu le remarquer, l'herbe est en avance cette année ! Les températures dignes d'un printemps ont favorisé une pousse précoce.

Données météo

23 février 2020	Altitude (m)	Précipitations (mm) du 17-févr. au 23-févr.	30 derniers jours	Somme de températures depuis le 1er février (°C-jour) 2020	2019	année moy	Mise à l'herbe prairies TP / RGI 250 °j	prairies précoces 300 °j	prairies tardives 400 °j
St-Girons	414 m	5 mm	29 mm	222°	181	130	26-févr.	5-mars	17-mars
Cos	519 m	3 mm	29 mm	214°	171	130	28-févr.	7-mars	19-mars
Leran-Lourmatel	391 m	3 mm	19 mm	205°	152	135	1-mars	8-mars	19-mars
Montaut	295 m	2 mm	18 mm	236°	191	134	25-févr.	4-mars	16-mars
Mazères Le Massuet	223 m	1 mm	15 mm	216°	181	-	28-févr.	5-mars	15-mars

Les sommes de température sont en avance d'environ 1 semaine par rapport à une année moyenne. Il faut se préparer à sortir vos animaux en fin de semaine pour les prairies fertiles et précoces des exploitations d'une altitude inférieure à 500m.

Altitude :

Simulation 600m	181°
Simulation 800m	117°
Simulation 1000m	52°

Repères en sommes de température :

	Mise à l'herbe
Prairie temporaire	250 °C jour
Prairie permanente fertile et précoce	300 °C jour
Prairie permanente plus tardive	400 °C jour

Cette semaine, quelques précipitations seront présentes en milieu et fin de semaine. Les températures baisseront un peu mais seront plutôt douces pour un mois de février.

Prévisions Météo :

mer 26	jeu 27	ven 28	sam 29	dim 01	lun 02	mar 03
5°C / 10°C	3°C / 15°C	8°C / 17°C	6°C / 13°C	4°C / 10°C	4°C / 10°C	4°C / 11°C
12 mm	0,6 mm	0,3 mm	4,8 mm	5,2 mm	6,4 mm	1,4 mm

(Données Météo France pour Foix au 24 février)

C'est le moment de préparer vos clôtures !

Profitez du beau temps pour préparer activement la mise à l'herbe. Elle est prévue fin février sur les prairies précoces. Il est grand temps de réfléchir à l'organisation de votre pâturage : déterminez les lots d'animaux et mettez en place vos clôtures.

Une bonne gestion de la ressource en herbe permet d'augmenter la durée de pâturage et de générer des économies.

Comment organiser son pâturage tournant ?

3 étapes clefs sont essentielles à la bonne mise en place du pâturage tournant.

1) Déterminer la surface de base

On entend par surface de base la surface qui sera pâturée par les animaux.
Elle se calcule à partir du chargement instantané et varie selon le potentiel de production des prairies, la qualité du couvert végétal et la conduite de la fertilisation :

Type de prairies	Chargement moyen à prévoir
Prairies précoces et productives	30 ares/UGB
Prairies moyennement précoces	40 ares/UGB
Prairies tardives peu fertiles	50 ares/UGB

Il est nécessaire de répartir la surface de base en fonction des lots d'animaux qui vont pâturer et de leurs besoins journaliers.

Surface de base affectée à un lot = nombre d'UGB dans le lot x chargement moyen

Exemple :

Pour 100 UGB sur des prairies moyennement précoces, on prévoira 40ha de pâturage (100 x 40 = 4000 ares soit 40ha).

2) Répartir la surface de base

Toujours veiller :

- À ce que le temps de séjour soit inférieur à 8 jours par parcelle, pour éviter le surpâturage
- À ce que le temps de repos d'une parcelle ne soit pas inférieur à 21 jours pour permettre une repousse suffisante de la prairie

Tableau des correspondances pour le calcul du chargement instantané (minimum 10 UGB/ha, optimum : 30 UGB/ha)		Nombre de paddocks		
		5	8	12
Chargement moyen surface de base (ares/UGB)	30	6 ares/UGB 17 UGB/ha	3,8 ares/UGB 26 UGB/ha	2,5 ares/UGB 40 UGB/ha
	40	8 ares/UGB 12 UGB/ha	5 ares/UGB 20 UGB/ha	3,3 ares/UGB 30 UGB/ha
	50	Impossible	6,3 ares/UGB 16 UGB/ha	4,2 ares/UGB 24 UGB/ha

Equivalences :

Animaux	UGB
Vache allaitante + veau	1
Vache allaitante	0,85
Vache laitière	1
Brebis et agnelle	0,15
Génisse de + 2 ans	0,75
Génisse de 1 à 2 ans	0,6
Génisse de - d'1 an	0,4

3) Découper les parcelles

L'accès à l'eau pour l'abreuvement des animaux est un élément essentiel pour le découpage des parcelles. Il faudra donc veiller à ce que la distance parcourue par les animaux pour aller s'abreuver ne soit pas supérieure à 200 m (notamment pour les vaches laitières).

La pression de pâturage doit être suffisante pour éviter le gaspillage (refus) au moment de la pleine pousse de l'herbe et, par conséquent, la dégradation de la prairie.

Remarque :

On privilégiera les pâtures proches des bâtiments pour les animaux qui nécessitent de rentrer tous les jours (traite, tétée, ...).

Action financée par:

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale «développement agricole et rural»

Contact : estelle.dubarry@ariege.chambagri.fr / patrick.beral@ariege.chambagri.fr

Les préconisations issues de ce bulletin découlent :
- des données météo France sur 4 stations du département
- des mesures de la pousse de l'herbe faites sur l'exploitation suivie

Vous pouvez consulter ce bulletin sur notre site internet :
www.ariege.chambagri.fr
Et sur la page Facebook de la Chambre d'Agriculture de l'Ariège

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE ARIÈGE