

Note d'information FCO_ Maladie Hémorragique Epizootique

Les signes cliniques qui doivent vous alerter :

1. Démarche raide, difficultés au déplacement +/- hyperthermie,
2. Apparition des signes au niveau de la face : conjonctivite, érosion +/- ulcères du mufle avec écoulements nasaux, ulcères des gencives rapidement nécrotiques et nauséabonds, atteintes de la langue fréquentes avec ulcères importants +/- œdèmes, cyanoses +/- paralysie,
3. Possibilité d'avortements, diarrhée +/- hémorragique, paralysie, dans des cas plus rares.

Utilisation des insecticides intéressante mais non efficace à 100% vu la durée d'incubation, en zone infectée intérêt de traiter les animaux malades pour essayer de limiter la contamination.

Protocole et traitements à mettre en place :

1. Appeler son vétérinaire traitant,
2. Anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) sur 3 jours, antibiotiques au besoin pour éviter les surinfections,
3. Si pas d'amélioration s'inquiéter, une visite vétérinaire est nécessaire,
4. Gestion de la déshydratation (voir avec votre vétérinaire) si défaut d'abreuvement prolongé.

SURTOUT : surveillance matin et soir car évolution possible en 12h et plus les animaux sont pris en charge tôt, meilleur est le résultat.

En complément, rentrer les animaux ou donner du foin dehors car impossibilité d'arracher l'herbe (douleur+++).

Nous vous tiendrons informés des prochaines évolutions.

